



המלצות לטיפול בדקלים הנטועים בנוי כנגד חדקונית הדקל האדומה

שמעון ביטון, חיים אורן ואביגיל הלר - שרות ההדרכה והמקצוע
ד"ר ויקי סורוקר - מינהל המחקר החקלאי

טיפול וחומרים אלו או אחרים.
אזור גוש דן עלול להיתקף בקיץ הקרוב ועל כן מומלץ להיערך ובתאום ובהתייעצות עם שה"מ, משרד החקלאות.

עץ מת ויבש - מגמיעים את הקדקוד כמי תואר לעיל, גוזמים את כפותיו ועוטפים את קדקוד הדקל ביריעת פלסטיק ומהדקים בחוט לגזע. זאת, כדי למנוע תפוצה של חי פושיות בוגרות הנמצאות בקדקוד אל עצים אחרים. כעבור תקופה של לפחות שבוע, כור תים את העץ וגורסים אותו במרסקת גזם. את הגזם מרססים בסימבוס 0.5% ואח"כ מפנים אל מחוץ לגן. את הכפות הגזומות יש לרסק במרסקת גזם או לשרוף (יש לקבל אישור לשריפה במחוזות משרד החקלאות).

העתקת דקלים - אין ערובה לכך, שדקלים מועתקים אינם מכילים את הפתוגן. המעתיק עצי דקל עושה זאת על אחריותו בלבד. מומי לץ לטפל בעצים המועתקים כמתואר לעיל וכמובן יש להמשיך ולתת טיפולי מניעה במקום החדש.

בעת רכישת דקלים ממשלתה יש לוודא כי העצים מטופלים בהתאם להמלצות.

דיווח על נגיעות בחדקונית על כל תמר נגוע בחידקונית מומלץ לדווח בקישור הבא: http://weevil.agri.gov.il/he/pages/the_weevil.php כדי שיהיו לנו נתונים לניטור.

כריתת עץ תמר מחוייבת ברשיון כריתה, יש לפנות לפקיד היערות האזורי בקק"ל או לרשות המקומית.

ממנו הם הוסרו, 3 פעמים בהפרש של שבוע ולמרוח משחת גזיום.

הצבת מלכודות על מנת לצמצם את השי מוש בחומרי הדברה וגם למעקב אחר הני גיעות באזור, רצוי להציב מלכודות ללכידת חדקונית הדקל האדומה. המלכודת תוצב על פני הקרקע ובצל.

בהצבת מלכודת ליד דקל קנרי חייבים לשמור מרחק של 25 מטר מהעץ. אם לא ניתן ומלכודת תוצב בסמוך לעץ חייבים לטפל בעץ הקרוב ביותר בחומרים כימיים כנ"ל.

בשדרה או בגנים ציבוריים בהם יש ריכוזי דקלים נציב את המלכודות במרחקים של 25 מטר אחת מהשנייה.

בגינות פרטיות ניתן להציב מלכודת לגינה. בכל המקרים יש להקפיד לטפל טיפול כימי בעץ הסמוך למלכודת.

את המלכודות הכרחי לתחזק ולוודא כי היא מכילה את כל החומרים הפעילים: נדי פית פרומון, בקבוק עם אתיל אצטט, מים, מולסה. ניתן להוסיף גם חומר צמחי כגון פי רות תמרים.

ישנה חשיבות לכך שהטיפול יעשה במקביל הן בשטחים ציבוריים והן בשטחים פרטיים זאת במטרה למנוע מעבר של החיפושית משטחים לא מטופלים אל אלו שטופלו ועל ידי כך עלולה להיווצר נגיעות חוזרת.

בשלב זה נבחנים דרכי טיפול וחומרים נר ספים (הזרקות לגזע, נמטודות, פטריות טפי ליות ועוד). טרם גובשה המלצה לגבי שיטות

מומלץ לטפל בכל עצי התמר הקנרי והתמר המצוי בישראל כאשר באזור גוש דן (הרצליה, תל אביב-יפו, רמת גן, ראשון לציון, גבעתיים ועוד), נס ציונה וא שדוד יש לבצע ניטור ולשקול התחלת טיפול. יש לנטר מיני ושינגטוניה, סייגרוס רר מנזוף (המכונה "קוקוס"), ארכייתמר אלכסנדרין (המכונה דקל טבעות), תמר רובי ליני ומיני דקלים נוספים.

טיפול

טיפול בהגמאת קדקוד הדקל על ידי תע רובת של החומרים הבאים:
קונפידור 20 מ"ל
סימבוס 20 מ"ל
פוליקור 0.2%

נפח תרסיס 20-5 ליטר לעץ בהתאם לגודל העץ. את החומר יש להחדיר באיטיות (עד נגי רה) לבסיסי הלולב משני צידי העץ.

הטיפול יעשו לצורך טיפול מניעה והדב רה אחת לשלושה חודשים. בחודשים דצמי בר-פברואר אין צורך לטפל בעצים.

לדקלים מושקים מומלץ להוסיף את החומרים במינונים, שהוזכרו, גם באמצעות הגמעה לאזור בית השורשים.

בעצי תמר מצוי בעלי חוטרם יש לרס את החוטרם עד כדי הרטבה מלאה ונגירה, באותם המינונים.

הורדת חוטרם תעשה רק, אם יש הכרח לעשות זאת ובעונת החורף בלבד.

במידה ומסירים חוטרם יש לרס, באותם המינונים, את האזור ממנו הם הוסרו 0 פע מים בהפרש של שבוע ולמרוח משחת גזיום.

יש להימנע ככל האפשר מגזום עצי דקל החדקוניות נמשכות לעצים גזומים. עצים גזומים יש לרס באותם המינונים את האזור

